

# STREPTONAMID plv. a. u. v.

**Popis prípravku:** Biely až svetložltý prášok.

**Balenie:** 5 x 2,8 g.

**Spôsob uchovávania:** V suchu, pri teplote 0 – 25 °C, chrániť pred svetlom. Chrániť pred deťmi.

## Zloženie:

Streptomycini sulfas 1,34 g (1 000 000 m. j.),  
Phtalylsulfathiazolum 1,00 g v 1 vrecku (2,8 g).  
Pomocné látky: Bentonitum (bentonit).

## Dávkovanie:

**Kôň:** 2-krát denne 2 – 3 vrecká počas 3 dní.  
**Teľa, žriebä:** 2-krát denne 1 vrecko počas 4 – 5 dní.  
**Ciciak:** 2-krát denne 0,5 – 0,3 vrecka počas 3 – 5 dní.  
**Pes:** 2-krát denne 0,5 – 1 vrecko počas 4 – 5 dní.  
Liečba sa nesmie skracovať ani vtedy, ak nastane zlepšenie už po prvej dávke.

## Spôsob použitia:

V malom množstve krmiva alebo nápoja pred kŕmením. V prípade úplnej inapetencie je možné dávku aplikovať vo forme bolusu alebo elektuaria.

## Čas použiteľnosti:

24 mesiacov.

## Ochranné lehoty:

Mäso 15 dní. Nepodávať koňom, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

## Indikačná skupina:

Antibiotikum.

## Dovozca:

Bioveta SK spol. s r.o., Slovakia



## Charakteristika:

Liek je kombináciou dvoch vysokoúčinných antibakteriálnych zložiek – antibiotika a chemoterapeutika sulfónamidového typu. Obidve účinné látky sa v tráviacom ústrojenstve neresorbujú, takže celá terapeutická účinnosť lieku je sústredená prevažne do lúmena tráviacej trubice, kde pôsobí intenzívne na mikroflóru.

## Indikácie liekov:

Infekčné ochorenie tráviaceho ústrojenstva vyvolané mikroorganizmami citlivými na účinné látky obsiahnuté v lieku, hnačky a úplavice teliat, bakteriálne enteritídy ošípaných, enteritídy všetkých druhov zvierat aj laboratórnych. Perorálna liečba po pôvodnej injekčnej aplikácii streptomycínu.

## Kontraindikácie:

Teľatá vo veku nad 3 mesiace (s rozvinutými predžalúdkami).

## Výrobca:

Bioveta, a. s., Česká republika.

**BIOVETA SK**

WWW.BIOVETA.SK

BIOVETA SK, spol. s r.o.

Kalvárska 3, 949 01 Nitra

Tel.: +421 31/656 23 90

Fax.: +421 37/651 02 21