

ASA plv. sol. a. u. v.

Popis prípravku: Jemne kryštalický biely až ružovkastý prášok.

Balenie: 100 g, 450 g.

Spôsob uchovávania: Pri teplote 15 – 25 °C, v tme a suchu.
Uchovávať mimo dosahu detí.

Zloženie:

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: Kyselina acetylsalicylová 467,0 mg.

Pomocné látky: Hydrogénuhličitan sodný.

Dávkovanie:

Individuálne:

Tel'atá: Dávka kyseliny acetylsalicylovej pre tel'atá je cca 50 mg/kg ž. hm./deň. Optimum podania prípravku je 100 mg lieku na kg ž. hm.

Kone: 10 – 60 g na kus.

Ošipané: 5 g na 50 kg živej hmotnosti 1- až 2-krát denne

Morky, kur domáci: 5 g (jedna zarovnaná čajová lyžička) na 50 kg ž. hm. 1 až 2-krát za deň.

Hromadné:

Ošipané: Jedno orig. balenie (450 g) lieku na 1000 litrov vody – liečebne, jedno orig. balenie (450 g) lieku na 2000 litrov vody – preventívne.

Morky: Jedno orig. balenie (450 g) lieku na 1000 litrov vody – liečebne, jedno orig. balenie (450 g) lieku na 2000 litrov vody – preventívne.

Brojlery: Jedno orig. balenie (450 g) lieku na 500 litrov vody – liečebne, jedno orig. balenie (450 g) lieku na 1000 litrov vody – preventívne.

Mládky: Jedno orig. balenie (450 g) lieku na 1000 litrov vody.

Čas použiteľnosti:

6 mesiacov. Po prvom otvorení ihneď spotrebovať celý obsah balenia.

Indikačná skupina:

Antipyretikum, antiflogistikum, analgetikum.

Interakcie:

Pri kombinácii s liekmi ovplyvňujúcimi zrážanie krvi je možnosť zvýšeného krvácania. Liek sa nemá podávať súčasne s liekmi obsahujúcimi kortikosteroidy.

Kyselina acetylsalicylová potenciuje účinok vitamínu C, ktorý má významnú úlohu pri obrane zvierat pred infekciou, pôsobí priaznivo na rezistenciu kapilár a zrážanlivosť krvi.

Výrobca:

Bioveta SK spol. s r.o., Slovakia



Charakteristika:

Kyselina acetylsalicylová pôsobí protizápalovo, antipyreticky a analgeticky, patrí medzi nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs).

Indikácie liekov:

Tel'atá, kone: Horúčkovitý a bolestivý stavy, zápalové ochorenia.

Ošipané: Prevencia a liečba porúch obehového systému, vysoká teplota prostredia, respiračný syndróm prasiat, horúčkové stavy pri infekciách, začínajúce sa kĺbové ochorenia.

Kur domáci, morky: Prevencia a liečba porúch obehového systému (ascites brojlerov), vysoká teplota prostredia, horúčkové stavy pri infekciách, respiračné problémy, začínajúce sa kĺbové ochorenia.

Kontraindikácie:

Poruchy zrážania krvi, vredová choroba žalúdka a čriev.

Nepodávať zvieratám, ak je teplota prostredia výrazne nízka pri chladovom strese.

Upozornenie:

Liek sa nesmie podávať zvieratám umiestnených v prostredí s veľmi nízkou teplotou pri chladovom strese, lebo pôsobením kyseliny acetylsalicylovej sa zvyšuje výdaj tepla, ktorému sa organizmus v studenom prostredí bráni. Môže dôjsť k zhoršeniu pôsobenia chladu na organizmus zvierat.

Asi pri 0,2 % populácie ľudí sa môžu vyskytnúť alergické reakcie: koprivka, angioneurotický edém, začervenanie, pustulárna psoriáza, nádcha, astma, opuch laryngu, angina pectoris, aj smrť, opuch očných viečok, jazyka a tváre. Pri manipulácii s liekom sa odporúča používať ochranné rukavice a respirátor.

Spôsob použitia:

Liek sa podáva perorálne, rozpustený v pitnej vode. Liek sa podáva jedenkrát denne, liečebne sa môže podať aj 2 – 3-krát za deň po 6 – 8 hodinách. Dĺžka podávania lieku je maximálne 10 dní za sebou pri dennom používaní. Liek sa môže zvieratám opäť podávať po trojdňovej pauze.

BIOVETA SK

WWW.BIOVETA.SK

BIOVETA SK, spol. s r.o.

Kalvárska 3, 949 01 Nitra

Tel.: +421 31/656 23 90

Fax.: +421 37/651 02 21